



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

دستورالعمل انجام آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین

این دستورالعمل با توجه به دستورالعمل صادره سال ۱۳۵۳ شورای عالی سازمان نظام پزشکی و پیشنهاد مورخ ۸۹/۴/۲ معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ در معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته و در تاریخ در شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصویب گردیده است.

- ۱- گروههایی از جامعه که می بایست تحت آزمون پوستی پنی سیلین قرار گیرند
- ۲- گروههایی از جامعه که تزریق پنی سیلین و مشتقات آن در آنها ممنوع است
- ۳- تجهیزات و مراکز مجاز تزریق پنی سیلین
- ۴- روشهای تهیه محلول آزمون پوستی پنی سیلین
- ۵- روشهای انجام و تفسیر آزمون پوستی پنی سیلین
- ۶- احتیاطهای قبل و بعد از انجام آزمون و تزریق پنی سیلین
- ۷- حساسیت به پنی سیلین و مشتقات آن و سفالوسپورین ها
- ۸- پنی سیلین و مشتقات آن
- ۹- نحوه استفاده از Pre-Pen در تست پوستی پنی سیلین



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

۱- گروههایی از جامعه که می بایست تحت آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین قرار گیرند:

با توجه به اینکه سطح اطلاعات عمومی مردم به جز در موارد محدود، جهت اخذ شرح حال و سوابق قبلی حساسیت به پنی سیلین قابل اطمینان و تصمیم گیری توسط کادر درمانی نیست و از آنجائیکه آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین بسیار دقیق تر از شرح حال آلرژی به این گروه دارویی می باشد، بهتر است این آزمون برای تمامی مراجعین (بجز موارد محدود مندرج در بند ۱-۲ همین دستور العمل) که برای آنها پنی سیلین تزریقی تجویز شده است انجام شود.

۲- گروههایی از جامعه که تزریق پنی سیلین و مشتقات آن در آنها ممنوع است:

۲-۱- کلیه کسانی که با تشخیص پزشک دارای تاریخچه قطعی حساسیت به پنی سیلین و مشتقات آن و سفالوسپورینها هستند. بدیهی است انجام تست پنی سیلین نیز در ایشان ضرورتی ندارد.

۲-۲- کلیه کسانی که اندیکاسیون دریافت پنی سیلین تزریقی دارند و تست پنی سیلین در آنها مثبت است.

تبصره ۱: تفسیر تست پنی سیلین و اخذ شرح حال حساسیت قطعی به پنی سیلین و مشتقات آن و سفالوسپورین ها تنها در صلاحیت پزشک است.

تبصره ۲: منظور از آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین ابتدا تست خراشی (prick test) و سپس تست داخل جلدی (intradermal) می باشد.

۳- تجهیزات و مراکز مجاز تزریق پنی سیلین:

کلیه درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز جراحی محدود، مطب ها و سایر مؤسسات درمانی دارای پروانه، مجهز به تجهیزات و وسایل احیا و تحت نظر مستقیم پزشک.

تجهیزات شامل کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت احیای قلبی، عروقی و تنفسی مانند وسایل ساکشن، کپسول اکسیژن، آمیوبگ، وسایل انتوباسیون، وسایل کنترل فشارخون، سرم تزریقی سدیم کلراید ۰/۹٪ (نرمال سالین) و یا رینگرلاکتات، آمپول اپی نفرین، آنتی هیستامین تزریقی (دیفن هیدرامین)، آمپول آمینوفیلین، آمپول هیدروکورتیزون وریدی می باشد.

تبصره ۵: تزریق آمپول پنی سیلین و انجام تست آن می بایست با تجویز پزشک و تحت نظر وی با ارائه نسخه انجام گیرد.



۴- روشهای تهیه محلول تست پنی سیلین:

۴-۱- با استفاده از ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد:

روش اول: 5cc آب مقطر را به ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد اضافه می نمائیم. پس از انحلال، ۰/۰۵ cc (پنج صدم) از این محلول (۵ خط سرنگ انسولین) را داخل سرنگ انسولین کشیده سپس حجم سرنگ انسولین را با آب مقطر به 1cc (تا خط صدم سرنگ انسولین) می رسانیم. محلول بدست آمده پنی سیلین G ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

روش دوم: ۱۰cc آب مقطر را به ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال 1/000/000 واحد اضافه می نماییم. پس از انحلال ۱ cc از محلول بدست آمده را با ۹ سی سی آب مقطر رقیق می کنیم. محلول بدست آمده محلول تست پنی سیلین ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

۵- روشهای انجام و تفسیر تست پنی سیلین:

۵-۱- تست خراشی (Prick Test):

یک قطره از محلول تهیه شده تست پنی سیلین G ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر را روی پوست سطح قدامی ساعد قرار داده و در محل قرار دادن قطره با سر سوزن اندازه ۲۰، یک خراش به طول ۳ تا ۵ میلی متر بدون خونریزی ایجاد می کنیم. چنانچه بعد از گذشت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرمزی یا سفتی به اندازه حداقل ۲×۲ میلی متر و یا با قطر بیش از ۴ میلی متر در ناحیه دیده نشد، تست منفی است و به تنهایی قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود. قرمزی و سفتی (اندوراسیون) بیش از ۱۵ میلی متر تست مثبت تلقی می شود و نباید پنی سیلین تزریق گردد. در صورتیکه قرمزی و سفتی بین ۴ تا ۱۵ میلی متر ایجاد گردید تست قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود.

تبصره: اگر خونریزی در محل تست خراشی رخ داد، تست صحیح انجام نشده و باید محل دیگری برای تست انتخاب شده، مجدداً تست انجام شود.



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

۵-۲ - تست داخل جلدی (intradermal):

۰/۰۲ میلی لیتر (دو خط سرنگ انسولین) از محلول تست پنی سیلین G را در سطح قدامی ساعد به صورت داخل جلدی تزریق می نمائیم. پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در صورت عدم ایجاد کهیر و تورم، حداقل به اندازه ۶×۶ میلی متر و یا حداقل ۳ میلی متر بزرگتر از آزمون کنترل منفی، تست منفی خواهد بود.

۵-۳ - آزمون کنترل منفی و مثبت:

در صورت امکان بهتر است قبل از انجام تست داخل جلدی و یا همزمان با تست خراشی با پنی سیلین G، آزمون کنترل منفی (محلول نرمال سالین) و آزمون کنترل مثبت (هیستامین ۱ میلی گرم بر میلی لیتر) با یک قطره از هریک از مواد یاد شده روی سطح قدامی ساعد به صورت تست خراشی انجام شود.

۶- احتیاطهای قبل و بعد از انجام تست و تزریق پنی سیلین:

۶-۱- به مدت ۴۸ ساعت قبل از آزمون داخل جلدی، بیمار نباید داروی آنتی هیستامین، دوکسپین، ضد افسردگی سه حلقه ای، آستemizول و استروئید مصرف کرده باشد و از ۲ هفته قبل نیز نباید آنتی بیوتیک گرفته باشد.

۶-۲- تست داخل جلدی در محل استریلی در قسمت قدامی ساعد صورت می گیرد تا در صورت بروز واکنشهای شدید بتوان از تورنیکه استفاده کرد. تست داخل جلدی می بایست به سرعت انجام گرفته و یک حداقل برآمدگی قابل درک در زیر پوست ایجاد کند.

۶-۳- برای هریک از آزمون ها (تست داخل جلدی، تست خراشی، کنترل های مثبت و منفی) می بایست از سرنگهای جداگانه استفاده شود.

۶-۴- محل انجام هر تست باید حداقل ۱۵ سانتی متر با آزمون کنترل آن فاصله داشته باشد.

۶-۵- سابقه آسم یا سابقه خانوادگی آتوپیک و آلرژی (بجز حساسیت قطعی به پنی سیلین) جزء موارد ممانعت کننده تزریق پنی سیلین محسوب نمی شود ولی بهتر است پس از انجام تست های لازم تزریق پنی سیلین در این افراد با احتیاط و مراقبت بیشتری صورت گیرد.

۶-۶- به دلیل بروز برخی از واکنشهای حساسیتی، حداقل تا نیم ساعت بعد از تزریق پنی سیلین بیمار باید در همان محل تحت نظر پزشک قرار داشته باشد.

۶-۷- تزریق پنی سیلین می بایست در وضعیت خوابیده انجام شود.



۸-۶- آزمون پوستی حساسیت پنی سیلین قبل از آغاز هر دوره درمان با پنی سیلین می بایست حتماً انجام گیرد. بدیهی است در دروه های درمانی که بیش از یک تزریق می بایست صورت گیرد، انجام یکبار تست در ابتدای دوره کافی است.

۹-۶- محلول تهیه شده تست پنی سیلین ۴۸-۱۲ ساعت در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد در یخچال قابل نگهداری می باشد.

۷- حساسیت به پنی سیلین و مشتقات آن و سفالوسپورین ها :

منظور از سابقه حساسیت به پنی سیلین بروز هریک از موارد زیر پس از مصرف پنی سیلین و مشتقات آن و سفالوسپورین ها می باشد:

شوک آنافیلاکتیک (با علائم کلاپس حاد عروق محیطی ، همراه یا بدون دیسترس تنفسی و یا اسپاسم نایژه ها، افت فشارخون، ورم حنجره، کهیر منتشر، درد شکم، تهوع و استفراغ، ضعف شدید و شوک)، اریتم مولتی فرم ، سندرم استیونس جانسون، سندرم lyell، درماتیت پوسته شونده ، بثورات پوستی ماکولوپاپولار، اریتما نودوزم، کهیر و یا کهیر غول آسا، تب دارویی ، بثورات ماکولوپاپولار دیررس و واکنشهای Serum Sickness (با علائم تب، بثورات پوستی، درد مفصلی، لنفادنوپاتی، بزرگی طحال، اختلالات الکتروکاردیوگرام، ادم منتشر، هماچوری، آلبومینوری).

۸- پنی سیلین و مشتقات آن :

منظور از پنی سیلین و مشتقات آن داروهای ذیل میباشد :

پنی سیلین ۳،۳،۶ ، پنی سیلین G بنزاتین، پنی سیلین G پروکائین، پنی سیلین کریستال یا پنی سیلین G پتاسیم و سدیم، پنی سیلین V بنزاتین، پنی سیلین V پتاسیم، نفسیلین، متی سیلین، کلوگزاسیلین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، پیپراسیلین.

۹- سفالوسپورین ها:

سفازولین، سفیکسیم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفتی زوکسیم، سفالکسین، سفتریاکسون، سفالوتین

۱۰- نحوه استفاده از Pre-Pen در تست پوستی پنی سیلین:

با توجه به اینکه در حال حاضر محلول Pre-Pen در ایران وجود ندارد می بایست برای انجام تست از روش های تهیه محلول تست که به آن اشاره شده است استفاده گردد . بدیهی است در صورت در دسترس قرار گرفتن محلول Pre-Pen استفاده از آن ارجحیت دارد.



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

مرحله اول: تست خراشی با pre-pen و Minor determinant : خراشی بدون خونریزی با لانست روی پوست

ایجاد می کنیم سپس روی محل خراش یک قطره از محلول های زیر قرار می دهیم.

• یک قطره از محلول pre-pen (full strength)

• یک قطره از محلول پنی سیلین ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر

مرحله دوم: محل خراش پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بررسی می شود در صورتی که واکنشی مانند خارش یا اریتم یا

کهیر در محل تست بروز کند، نتیجه تست مثبت است در اینصورت مراحل بعدی تست صورت نمی گیرد و تزریق

پنی سیلین ممنوع است .

مرحله سوم: اگر نتیجه تست خراشی منفی بود تست داخل جلدی به شکل زیر انجام شود.

تزریق pre-pen (full strength) به میزان ۰/۰۲ ml داخل جلدی

تزریق Penicillin G ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر به میزان ۰/۰۲ ml داخل جلدی

کنترل مثبت (هیستامین) و کنترل منفی (سالین)

مرحله چهارم: محل تزریق های داخل جلدی بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بررسی می شود چنانچه خارش، اریتم و یا

کهیری با ابعاد بزرگتر از ۴ میلی متر و یا واکنش بروز کهیر در ابعادی ۵۰٪ بزرگتر از ابعاد برآمدگی اولیه محل

تزریق pre-pen یا پنی سیلین G ۱۰/۰۰۰ واحد بر میلی لیتر بروز نماید، پاسخ به تست مثبت است و محل

تزریق کنترل هیستامین و کنترل سالین ارزیابی می شود. اگر محل تزریق کنترل هیستامین مثبت نباشد، وجود

تداخل عوامل آنتی هیستامین باید ارزیابی شود. ای